

## ¿Cuándo debe su niño/a quedarse en su hogar y no asistir a la escuela?

Muchos padres están preocupados acerca de cuándo deben de mantener a los niños que han estado enfermos en su casa y fuera de la escuela. Estas guías lo ayudarán. Si en cualquier momento usted tiene preguntas, no dude en llamar a la enfermera de la escuela.

1. **Fiebre:** Su niño/a debe de quedarse en su hogar si él/ella tiene fiebre de 100 grados (oralmente, arteria temporal, ruta timpánica) o más. Su niño/a debe de **NO TENER FIEBRE** por 24 horas antes de regresar a la escuela. Su niño/a NO es considerado el no tener fiebre si usted todavía le está administrando medicamentos para bajarle la fiebre. (ej: acetaminofeno, ibuprofeno). Recuerde que la aspirina NO es recomendable para los niños.
2. **Vómito o diarrea:** Su niño/a debe de mantenerse en su hogar si él/ella ha vomitado o tiene diarrea (más que heces sueltas) 12 horas antes de que comience la escuela. Si su niño/a se enferma en la escuela, ellos necesitan no haber vomitado ni haber tenido diarrea antes de regresar a la escuela.
3. **Conjuntivitis aguda:** La conjuntivitis es muy contagiosa. Si la parte blanca del ojo de su niño/a está roja y tiene cualquier tipo de drenaje usted debe de mantener a su niño/a en su hogar. Contacte al doctor de su niño/a. Los ojos deben de estar normales antes de regresar a la escuela. Por favor notifique a la maestra y la enfermera si usted está tratando a los ojos de su niño/a por las alergias.
4. **Piojos:** Los niños con piojos deben de ser tratados con productos de matar piojos y todas las liendres (los huevos) debe de ser sacados del pelo. Ningún producto mata a las liendres. Éstas deben de ser removidas o incubarán y el ciclo continuará. Por favor contácteme si usted descubre piojos o liendres en su niño/a.
5. **Varicela:** Los estudiantes no pueden regresar a la escuela hasta que las ampollas tengan costras o estén secas. Esto tomará de 7 a 10 días desde el comienzo de la enfermedad. Usted puede tener un caso más leve aunque haya tenido la inmunización. Muchos pediatras recomiendan 2 inmunizaciones.
6. **Impétigo:** Impétigo son llagas que se han infectado. Impétigo puede ser encontrado en cualquier parte del cuerpo incluyendo la cara. Las llagas se vuelven costras y pueden drenar material de infección. Contacte a su doctor. La infección necesita ser tratada o empeorará y puede expandirse a su niño y otros. Una vez que el tratamiento haya comenzado, su niño puede regresar a la escuela. Las llagas deben de estar cubiertas cuando está en la escuela.
7. **Faringitis Estreptocócica:** Si su niño/a ha sido diagnosticado con faringitis estreptocócica (esto requiere una prueba por un proveedor de salud) su niño/a debe de mantenerse en su hogar 24 horas después de comenzar la terapia con antibióticos (ya sea por medio oral o una inyección). Él/ella debe de no tener fiebre por 24 horas sin medicamentos como acetaminofén o ibuprofeno.

Recuerde: Nosotros apreciamos su ayuda en prevenir la expansión de las enfermedades en la escuela. Cuando los niños asisten a la escuela enfermos, ellos pueden infectar a otros niños, padres y maestras